

# Integrazione

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{j=1}^N w_j f(x_j) \quad a \leq x \leq b$$


$w_j$  pesi       $N$  più piccolo possibile.

## Metodi a spaziatura fissa


$$x_j = a + h \cdot j \quad 0 \leq j \leq N \quad h = \frac{b - a}{N}$$

Chiusi:  $a \in x_j, b \in x_j$

Aperti:  $a, b \notin x_j$



## Metodo del rettangolo




$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{j=0}^4 f(x_j) \quad \int_a^b f(x) dx = h \sum_{j=1}^5 f(x_j)$$

Considero l'integrale tra 0 e  $h$ .

$$\begin{aligned} \int_0^h f(x) dx &= \int_0^h (f(0) + x \cdot f'(0) + O(x^2)) dx \\ &= h \cdot f(0) + \frac{h^2}{2} f'(0) + O(h^3) \end{aligned}$$

Escludo quindi termini  $O(h^2)$ .

## Metodo del trapezio



L'area del trapezio è  $\frac{1}{2} \times (\text{base1} + \text{base2}) \times \text{altezza}$ .

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \frac{1}{2}(f_1 + f_2) \cdot (x_2 - x_1) = \frac{1}{2} \cdot h \cdot (f_1 + f_2) \\ &= \int_a^b f(x) dx \approx h \cdot \left( \frac{1}{2} \cdot (f_1 + f_2) + \frac{1}{2} \cdot (f_2 + f_3) + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{2} \cdot (f_3 + f_4) + \frac{1}{2} \cdot (f_4 + f_5) \right) \end{aligned}$$

$$w_1 = w_5 = \frac{h}{2} \quad w_2 = w_3 = w_4 = h$$

Per ogni intervallo uso i due valori estremi per calcolare l'integrale, mentre per il rettangolo valutavo la funzione solo in un punto.

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$f(b) \approx f(a) + f'(a)(b - a) \implies f'(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f(x) \approx f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

$$\int_a^b f(x) dx = f(a) \cdot h + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \left| \frac{(x - a)^2}{2} \right|_a^b =$$

$$f(a) \cdot h + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{(b - a)^2}{2} = (b - a) \cdot \frac{f(b) + f(a)}{2}$$

## Formula di Simpson

$$\int_0^{2h} f(x) dx = Af(0) + Bf(h) + Cf(2h)$$

Sviluppo la serie di Taylor e uguaglio termine a termine

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{1}{2}x^2 f''(0) + \frac{1}{6}x^3 f'''(0) + \frac{1}{24}x^4 f^{iv}(0)$$

$$\int_0^{2h} f(x) dx = 2hf(0) + 2h^2 f'(0) + \frac{1}{6}(2h)^3 f''(0)$$

$$+ \frac{1}{24}(2h)^4 f'''(0) + \frac{1}{120}(2h)^5 f^{iv}(0)$$

$$\int_0^{2h} f(x) dx = 2hf(0) + 2h^2 f'(0) + \frac{4}{3}(h)^3 f''(0)$$

$$+ \frac{2}{3}(h)^4 f'''(0) + \frac{4}{15}(h)^5 f^{iv}(0)$$

Uguagliando allo sviluppo del secondo membro

$$\begin{aligned}
&= Af(0) + B \left[ f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2}f''(0) + \frac{h^3}{6}f'''(0) + \frac{h^4}{24}f^{iv}(0) \right] \\
&+ C \left[ f(0) + 2hf'(0) + 2h^2f''(0) + \frac{4}{3}h^3f'''(0) + \frac{2}{3}h^4f^{iv}(0) \right] \\
&= (A + B + C)f(0) + h(B + 2C)f'(0) + h^2 \left[ \frac{B}{2} + 2C \right] f''(0) \\
&+ h^3 \left[ \frac{1}{6}B + \frac{4}{3}C \right] f'''(0) + h^4 \left[ \frac{1}{24}B + \frac{2}{3}C \right] f^{iv}(0)
\end{aligned}$$

Poiché  $f(x)$  è arbitraria devono essere uguali i termini che moltiplicano le derivate dello stesso ordine:

1.  $A + B + C = 2h$
2.  $h(B + 2C) = 2h^2$
3.  $h^2(\frac{1}{2}B + 2C) = \frac{4}{3}h^3$
4.  $h^3(\frac{1}{6}B + \frac{4}{3}C) = \frac{2}{3}h^4$
5.  $h^4(\frac{1}{24}B + \frac{2}{3}C) = \frac{4}{15}h^5$

Le prime tre equazioni sono un sistema di 3 equazioni in 3 incognite.

$$1) A + B + C = 2h$$

$$2) h(B + 2C) = 2h^2$$

$$3) h^2\left(\frac{1}{2}B + 2C\right) = \frac{4}{3}h^3$$

Sottraendo  $h$  volte 2) da 3) ottengo:

$$2C = 3h \quad C = \frac{h}{3} \quad B = 2h - \frac{2}{3}h = \frac{4}{3}h \quad A = 2h - \frac{4}{3}h = \frac{1}{3}h$$

$$A = C = \frac{1}{3}h$$

$$B = \frac{4}{3}h$$

Considero ora la quarta equazione:

$$B + 8C = 4h \quad \text{con} \quad B = \frac{4}{3}h \quad \text{e} \quad C = \frac{1}{3}h$$

$$\frac{4}{3}h + \frac{8}{3}h = \frac{12}{3}h = 4h$$

L'equazione è soddisfatta. La quinta equazione non è invece soddisfatta e l'errore è perciò  $O(h^5)$ .

La formula di Simpson integra esattamente i polinomi di grado non superiore al terzo.

$$\int_0^{2h} x^3 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^{2h} = \frac{2^4 h^4}{4} = 4h^4$$

$$\frac{1}{3}hf(x=0) + \frac{4}{3}hf(x=h) + \frac{1}{3}hf(x=2h)$$

$$= 0 + \frac{4}{3}h^4 + \frac{8}{3}h^4 = \frac{12}{3}h^4 = 4h^4$$



Considero il caso di  $N$  intervalli tra  $a$  e  $b$  prendo  $x_1, x_2, \dots, x_n$  spazati di  $h$  e sia  $f(x_i) = f_i$ . Prendo tanti intervallini di ampiezza  $2h$ .

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{a+2h} f(x) dx + \int_{a+2h}^{a+4h} f(x) dx + \int_{a+4h}^{a+6h} f(x) dx + \dots + \int_{b-2h}^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = h \left( \frac{1}{3}f_1 + \frac{4}{3}f_2 + \frac{1}{3}f_3 \right) + h \left( \frac{1}{3}f_3 + \frac{4}{3}f_4 + \frac{1}{3}f_5 \right) + h \left( \frac{1}{3}f_{N-2} + \frac{4}{3}f_{N-1} + \frac{1}{3}f_N \right)$$

$$\int_a^b f(x) dx = h \left( \frac{1}{3}f_1 + \frac{4}{3}f_2 + \frac{2}{3}f_3 + \dots + \frac{4}{3}f_{N-1} + \frac{1}{3}f_N \right)$$

## Metodo di Gauss

Fino ad ora mi sono basato sullo sviluppo in serie di Taylor per trovare formule sempre più accurate di integrazione. Migliorando le formule potevo integrare polinomi di ordine sempre crescente.

Cerco una formula che, dato un numero finito di punti, sia esatta per i polinomi di grado più alto possibile.

Finora le formule hanno usato punti equispaziati. Se uso l'arbitrarietà che ho ancora nello scegliere  $x_j$  posso trovare formule che integrano polinomi di grado più alto.

Considero solo integrali tra  $-1$  e  $1$ . Ogni altro integrale su di un intervallo finito può essere ricondotto a questo con un cambio di variabili.

Se suppongo di conoscere i punti  $x_j$  dove viene valutata la funzione, posso risalire ai pesi  $w_j$  per i quali deve essere moltiplicato  $p(x_j)$  per rendere esatto l'integrale. Il sistema di  $N$  equazioni in  $N$  incognite  $w_j$

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{j=1}^N w_j \cdot p(x_j)$$

da' una soluzione unica se si considerano i primi  $N$  monomi  $1, x, x^2, x^3, \dots, x^{N-1}$  e le loro combinazioni lineari, quindi tutti i polinomi di grado inferiore a  $N$ .

Posso allora usare la scelta degli  $x_j$  per integrare anche polinomi di grado superiore.

Definisco i polinomi di Legendre  $P_n(x)$ .

$$P_0(x) = 1 \quad P_1(x) = x$$
$$nP_n(x) = (2n - 1)xP_{n-1}(x) - (n - 1)P_{n-2}(x)$$

Per  $n = 2$ :

$$2P_2(x) = 3xP_1(x) - P_0(x) = 3x^2 - 1 \implies P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

Se  $p(x)$  è un polinomio di grado  $2N - 1$  posso scrivere

$$p(x) = q(x)P_N(x) + r(x)$$

dove  $q(x)$  e  $r(x)$  sono rispettivamente quoziente e resto, entrambi di grado  $N - 1$ .

Ne segue in particolare che:

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \int_{-1}^1 q(x)P_N(x) dx + \int_{-1}^1 r(x) dx$$

Sfrutto ora una particolare proprietà dei polinomi di Legendre, quella di essere ortogonali a tutti i polinomi di grado inferiore, cioè

$$\int_{-1}^1 q(x)P_N(x) dx = 0 \quad \text{se } q(x) \text{ è di grado inferiore a } N$$

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \int_{-1}^1 r(x) dx = \sum_{k=1}^N w_k r(x_k)$$

L'integrazione del polinomio di grado  $2N - 1$  è ridotta a quella di un polinomio di grado  $N - 1$ , che però non conosco.

Uso l'arbitrarietà nello scegliere  $x_j$  per liberarmi di  $r(x)$

Poiché

$$p(x) = q(x)P_N(x) + r(x)$$

Scelgo per  $x_j$  i valori degli  $N$  zeri di  $P_N(x)$ , che esistono e sono reali. Allora, dato che

$$p(x_j) = q(x_j)P_N(x_j) + r(x_j) = r(x_j)$$

trovo

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{k=1}^N w_k r(x_k) = \sum_{k=1}^N w_k p(x_k)$$

$x_k$  e  $w_k$  a questo punto non dipendono da  $p(x)$ ,  $q(x)$  e  $r(x)$ , ma solo da  $P_N(x)$  che sono funzioni fissate quando si sceglie  $N$  e sono tabulate una volta per tutte.

Per una generica funzione  $f(x)$  si scriverà:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^N w_k f(x_k)$$

Questa formula a  $N$  punti è esatta per polinomi fino al grado  $2N - 1$ . Integra bene funzioni polinomiali o che assomigliano a polinomi.

Non va usata con funzioni come:  $e^{-x}$  ed  $e^{-x^2}$

Per estremi di integrazione qualsiasi uso un cambiamento di variabile

$$\int_a^b f(x) dx \quad x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}y$$

con  $-1 \leq y \leq 1$ ,  $dx = \frac{b-a}{2}dy$  ottengo

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}y\right) dy$$